

Université Ferhat Abbas – Sétif

Faculté de Médecine – Département de Médecine

Enseignement de la 5^{ème} année de médecine

VOCABULAIRE PSYCHIATRIQUE

Pr ALOUANI (Professeur de psychiatrie)

ABOULIE : sentiment d'impuissance et d'indécision rendant toute action difficile voire impossible.

ABREACTION ou catharsis : est une libération brutale, une décharge de contenus affectifs émotionnels refoulés.

ABSENCE : suspension paroxystique de la conscience avec amnésie, fréquente dans les épilepsies Petit Mal et Epilepsie Temporale.

ABSTRACTION : capacité de penser symboliquement.

ADDICTION : asservissement d'un sujet à une substance psycho-active.

AFFECT : tonalité subjective accompagnant une idée ou une représentation.

AGORAPHOBIE : phobie fréquente consistant en une angoisse devant les espaces découverts (traverser une place, un pont ou sortir dans la rue...)

AKATHISIE : effet extra-pyramidal. Difficulté à se maintenir dans une même position (assis-debout) – impatience motrice.

AKINESIE : difficulté dans l'initiative du mouvement, lenteur des gestes, perte des mouvements associés (exemple : perte du balancement des mains lors de la marche dans le syndrome parkinsonien) – absence de mouvements – perte soudaine et brève du tonus musculaire dans l'épilepsie akinétique.

ALEXIE : perte de la compréhension du langage écrit, sans anomalie du langage oral ou de l'écriture.

ALZHEIMER : variété de démence, fréquente, dûe à une atrophie pariéto-temporo-occipitale.

AMBIVALENCE : coexistence au même moment d'émotions ou d'attitudes opposées (amour et haine, par exemple) vis-à-vis d'une personne ou d'un objet.

AMNESIE : incapacité totale ou partielle à évoquer les souvenirs passés : se rencontre dans les troubles organiques et dans les troubles névrotiques histrioniques.

- a- Rétrograde : perte de mémoire des souvenirs anciens. Atteinte de la mémoire à long terme : se rencontre au cours des démences.
- b- Antérograde : perte de la mémoire immédiate à court terme après un traumatisme – prise de toxiques- syndrome confusionnel – ischémie transitoire.
- c- Lacunaire : perte du souvenir d'un événement : se retrouve dans les troubles post-traumatiques – dans l'anxiété – dans les lésions cérébrales.

AMUSIE : aphasie partielle, perte du langage musical.

ANHEDONIE : absence de plaisir au cours d'une activité qui apportait auparavant des satisfactions. Symptôme fréquemment retrouvé dans les troubles dépressifs.

ANOSOGNOSIE : inconscience d'une maladie ou d'un handicap souvent retrouvé dans les troubles délirants et démentiels.

AGNOSIE : « troubles de la reconnaissance des éléments du monde extérieur » sans atteinte sensorielle élémentaire (agnosie auditive- tactile, etc...).

ANXIETE : sentiment de danger imminent, peur sans objet. Rencontrée dans toutes les maladies mentales mais plus caractéristique des troubles anxieux, des poussées schizophréniques, des états mélancoliques. Elle peut survenir en dehors de toute pathologie.

APATHIE : absence d'émotion et d'intérêt fréquemment retrouvée dans les dépressions ou dans les longues évolutions chroniques des psychoses.

ASSUETUDE : état de besoin impérieux psychique (et/ou) physique d'un produit naturel ou synthétique. Implique une pharmacodépendance.

ASTASIE-ABASIE : impossibilité de garder la position debout (astasie) et de marcher (abasie) avec absence de troubles neurologiques (sensibilité, motricité, coordination). Peut exprimer une conversion.

ATAXIE : incoordination des muscles dans l'exécution des mouvements volontaires, rencontrés dans les lésions du S.N.C.

ATHYMHORMIE : terme utilisé par Dide et Guiraud pour désigner des troubles de l'affectivité dans la schizophrénie, consistant en une indifférence aux joies et aux peines.

AUTISME : Richesse de la vie intérieure développée au détriment de la réalité extérieure. Syndrome retrouvé dans les schizophrénies et certaines psychoses infantiles.

BARRAGE : troubles du langage exprimant un trouble du cours de la pensée, consiste en une brusque suspension du discours souvent en milieu de phrase. Se rencontre dans les troubles schizophréniques.

BELLE INDIFERENCE : se dit des personnes présentant des conversions accompagnées d'une absence totale d'inquiétude concernant leur incapacité. Personnalité histrionique.

BLESITE : chez l'adulte, persistance de mutation phonétique substituant des voyelles ou des consonnes (zézaïement – chuintement...)

CATALEPSIE : conservation d'attitudes ou de postures. Se rencontre dans la schizophrénie catatonique.

CATAPLEXIE : paralysie temporaire. Entre le plus souvent dans le cadre de la narcolepsie.

CATATONIE : forme clinique de la schizophrénie, caractérisée par un négativisme, une rigidité posturale et des agitations impulsives spectaculaires.

CASTRATION : terme psychanalytique exprimant un fantasme élaboré par le petit enfant en réponse à la différence des sexes. La petite fille a été châtrée et le petit garçon vit une menace fantasmatique d'être castré par le père en représailles de ses désirs à l'égard de la mère.

C.I.M. 10 : Classification Internationale des maladies 10^{ème} révision. Chapitre V (F) Troubles mentaux et troubles du comportement. Organisation Mondiale de la Santé. Trad. de l'anglais C.B. Pull, 1993, 336 pages.

CLINOPHILIE : tendance pathologique à rester au lit de longs moments au cours de la journée.

COGNITION : toute faculté permettant la connaissance : perception – mémoire – jugement – raisonnement, altérée dans les troubles mentaux organiques : retard mental – démence.

COMPULSION : désir brutal à accomplir un acte irrationnel. Se rencontre dans les troubles obsessionnels-compulsifs.

CONFABULATION : faux souvenirs et fausses reconnaissances qui ont tendance à combler des lacunes mnésiques (syndrome de KORSAKOFF).

CONFUSION : désorientation temporo-spatiale. Se rencontre dans les troubles organiques.

CONSCIENCE : capacité d'organiser l'expérience sensible actuelle, de coordonner les données de nos sens et de notre mémoire. Parfois synonyme de vigilance.

CONVERSION : mécanisme de défense permettant d'exprimer symboliquement des idées refoulées par des symptômes somatiques (exemple : paralysie d'une main ou perte d'une fonction sensorielle...)

COPROLALIE : tendance impulsive involontaire à dire des mots vulgaires et obscènes. Se rencontre par exemple dans la maladie de Gilles de la Tourette.

DEJA VU : impression de vivre ou de voir ce qu'on a déjà vu. Se rencontre dans les troubles anxieux et lors des moments de fatigue.

DELIRE : croyance fautive entraînant une conviction inébranlable en sa réalité, malgré le désaccord de l'entourage et l'absence de confirmation dans la réalité. Se retrouve dans les psychoses. Caractérisée par un thème (persécution – jalousie – grandeur), par un mécanisme (hallucinatoire : interprétatif, intuitif, imaginatif) et par une structure : en secteur, en réseau, bien ou mal structuré.

DENI : de la réalité (Cf. psychanalyse) mécanisme de défense entraînant la méconnaissance d'une

réalité intolérable (dénier de la castration, déni d'une perception extérieure).

DEPERSONNALISATION : sentiment d'avoir perdu son identité, son unicité. Se retrouve dans l'anxiété, dans les troubles anxieux et dans les schizophrénies.

DEPLACEMENT : mécanisme de défense permettant de transférer sur des objets, des personnes ou des situations constituant des substituts acceptables, des idées ou des sentiments.

DEPRESSION : sentiment durable de tristesse, de pessimisme, de dévalorisation accompagné d'un ralentissement psycho-moteur. Peut définir un syndrome ou une maladie.

DEREALISATION : sentiment d'étrangeté de la réalité extérieure et d'inadéquation avec la réalité environnante. Fréquemment rencontrée dans les troubles anxieux et dissociatifs. Une partie de la réalité devient étrangère à la propre personne, alors que la pensée correspondant à une partie du Moi devient étrangère à soi-même.

D.S.M. IV : Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux de « l'American Psychiatric Association ». Traduction Française J.D. Guelfi. Masson Paris 1996, 384 pages.

DYSLALIE : troubles de l'élocution dus à des malformations ou à des lésions des organes de phonation.

DYSARTHRIE : troubles de la coordination, du langage. Déformation de la parole d'origine neurologique.

DYSKINESIE : mouvement involontaire répétitif, sans but. Peut-être secondaire à la prise de Neuroleptiques.

ECHOMIMIE : répétition de la mimique observée sur le visage d'autrui.

ECHOPRAXIE : tendance à répéter automatiquement des gestes effectués par d'autres personnes. Peut se voir chez les débiles mentaux.

ELATION : sentiment d'euphorie accompagné d'auto-satisfaction et d'optimisme : rencontre dans les pharmacodépendances.

ENURESIE : incontinence urinaire d'origine fonctionnelle, le plus souvent nocturne. Retrouvée chez l'enfant après 4 ans.

ERGOTHERAPIE : thérapeutique par l'activité physique et manuelle en vue d'une resocialisation.

EROTOMANIE : conviction délirante d'être aimé.

EUPHORIE : sentiment de gaieté et de bien-être psychologique et physique. Se retrouve dans les troubles maniaques et les pharmacodépendances.

EXTASIE : émotion intense de plaisir qui envahit le sujet. Se rencontre dans les états de transe.

FADING : après quelques mots, l'allocution se ralentit, les mots sont à peine ébauchés, à peine audibles et extinction de la voie et de la pensée. Se rencontre dans les troubles schizophréniques.

FETICHISME : déviation du comportement sexuel dans laquelle un objet ayant acquis dans

l'histoire individuelle du sujet une valeur de stimulus érogène privilégié (chaussures – bas - lingerie fine) ou une partie de l'objet sexuel (seins – cheveux – pieds) deviennent nécessaires à la réalisation ou la stimulation sexuelle.

FORMATION REACTIONNELLE : mécanisme de défense permettant à un sujet d'adopter des attitudes, des comportements, des idées, des affects, à l'opposé de ceux qui l'habitent. Se retrouve dans les troubles obsessionnels compulsifs.

FUITE DES IDEES : succession rapide des idées sans que le sujet ne puisse les arrêter.

GANSER : syndrome de Ganser : « réponses à côté » d'un sujet disposant d'un vocabulaire correct et d'une compréhension normale.

HALLUCINATIONS : perception sans objet, c'est-à-dire sans stimulations externes. Elle peut concerner tous les organes des sens (audition – vision – olfaction – goût – toucher). Se rencontre dans les psychoses et certaines pharmacodépendances.

HUMEUR ou **THYMIE** : tonalité affective de base oscillant entre deux pôles : la tristesse et la gaieté.

HYPERMNESIE : mémoire hypertrophiée, souvent concernant un thème particulier, des dates par exemple.

HYPERTROPHIE DU MOI : surestimation et valorisation excessive de soi. Se rencontre chez la personnalité paranoïaque ou narcissique.

HYPNOSE : état de conscience spécial au cours duquel l'environnement s'estompe au profit d'une relation privilégiée avec l'hypnotiseur.

HYPOCHONDRIE : préoccupation excessive concernant le fonctionnement de son propre corps. Se retrouve dans les troubles anxieux et les troubles thymiques.

IDEES DE REFERENCE : tendance à interpréter les incidents fortuits et les comportements d'autrui comme directement en relation avec soi-même. Leur fréquence et leur intensité peut constituer une activité délirante : délire interprétatif.

IDEE FIXE : idée prévalente qui revient sans cesse à l'esprit. Idée qui s'impose à notre conscience (compulsion – idée obsédante – idée délirante). S'impose avec une constance et une intensité jusqu'à parasiter la pensée, mais elle reste en accord avec une tendance idéo-affective actuelle (ego-syntone).

IDEES D'IRREALITE : sentiment que la réalité environnante est artificielle, illusoire « comme au cinéma ». Troubles anxieux et schizophrénie.

IDENTIFICATION : prendre d'une personne qu'on admire, un trait de caractère, un comportement ou un modèle de pensée.

IMMERSION : exposition d'emblée au stimulus le plus anxiogène, sans exposition progressive, d'un sujet présentant une phobie. Exemple : amener un sujet agoraphobe sur une place déserte.

INTEROJECTION : (Cf. psychanalyse) introduire symboliquement à l'intérieur de soi des objets

externes détectés ou aimés (à l'inverse de la projection). Mécanisme de défense au centre de la psychopathologie de la mélancolie ou état dépressif majeur.

ISOLATION : l'affect rattaché à une idée, devient totalement inconscient et détaché de l'idée. L'idée consciente se trouve ainsi séparée de l'affect. Se rencontre dans les troubles obsessionnels compulsifs. Elle permet à l'obsessionnel une mise à distance, affective d'où froideur, absence d'émotivité et de toute spontanéité.

ILLUSION : perception erronée. Réponse fautive à un stimulus sensoriel. C'est une déformation d'une perception vraie. Se retrouve dans la pharmacodépendance.

IMPULSION : besoin impérieux d'accomplir rapidement un acte à caractère agressif, délictueux ou incongru (l'acte en général échappe au contrôle volontaire du sujet).

JUGEMENT : capacité d'analyser et de découvrir des relations entre des idées ou situations : altéré dans les psychoses – dans les troubles organiques. Définit la capacité de trouver des relations de plus en plus complexes entre les idées et des événements. Capacité de synthèse.

KLEPTOMANIE : concerne les vols répétitifs et irrépissibles. L'objet dérobé n'ayant généralement ni utilité immédiate ni valeur financière. Le vol se déroule sans préparation, il est suivi d'un soulagement puis de remords.

LOGORRHEE : discours intarissable, fréquent dans les états maniaques.

MACROPSIE : perception erronée d'objets ou de personnes perçus plus grands qu'ils ne le sont dans la réalité. Se retrouve dans la pharmacodépendance.

MANIERISME : Expression motrice exagérée. Se rencontre dans les schizophrénies.

MASOCHISME : Tirer du plaisir de la souffrance. Perversion sexuelle caractérisée par la recherche d'une jouissance érotique obtenue dans la souffrance.

MASTURBATION : activité érotique permettant une jouissance sexuelle en utilisant la main. Fréquente chez l'adolescent chez lequel elle ne constitue pas un comportement pathologique.

MECANISME DE DEFENSE : opération inconsciente permettant un soulagement de l'anxiété conflictuelle (conversion – déplacement – formation réactionnelle – introjection – identification – régression ...sont des mécanismes de défense).

MEGALOMANIE : sentiment d'importance et de valeur démesurée. Se rencontre dans la manie, dans la paranoïa et dans les délires de grandeur.

MEMOIRE : capacité de garder et d'évoquer ce qu'on a vécu.

METAPHORE : consiste à transférer par analogie le sens d'un terme concret dans un contexte abstrait (un lit froid – pour signifier l'impuissance par exemple).

MUTISME : incapacité de parler. Se rencontre dans les activités délirantes essentiellement : persécution.

MYTHOMANIE : utilisé par DUPRE (1905) pour désigner une tendance pathologique au

mensonge et à la création de fables imaginaires.

MOI : C'est à partir de 3 ans que l'enfant commence à utiliser le « MOI » et le « Je » et à s'opposer afin de s'affirmer.

NARCISSISME : notion psychanalytique touchant l'amour de soi ou intérêt exagéré pour soi. Peut-être perçue comme pathologique chez l'adulte.

NARCOTHERAPIE : utilisation en intraveineuse de barbituriques et de stimulants pour faciliter l'expression des émotions.

NECROPHILIE : perversion sexuelle caractérisée par une attirance morbide pour les cadavres.

NEGATIVISME : résistance aux stimulations extérieures. Fréquent dans la schizophrénie hébéphrénique. Disposition permanente à lutter contre toute demande de l'entourage – résistance passive aux sollicitations (refus de la main tendue par exemple).

NEOLOGISME : création de nouveaux mots à partir d'autres mots. Se rencontre dans les affections organiques et dans les schizophrénies.

NEVROSE : affection caractérisée par une anxiété et un conflit inconscient source de symptômes dit « névrotiques », phobies, obsessions, conversions...

NOSOLOGIE : classification des maladies.

NYCTHEMERAL : rythme de 24 heures comprenant une période de veille et une période de sommeil.

NYMPHOMANIE : désir important et permanent pour l'activité sexuelle chez la femme.

OBJECTALE (relation) (Cf. Psychanalyse) : relation d'attachement d'un sujet à un objet. L'objet peut être constitué par une personne, par exemple la mère pour l'enfant dès l'âge de 3 mois.

OBNUBILATION : altération de l'orientation et de l'attention dans les affections organiques.

OBSESSION : intrusion dans le champ de la conscience d'une idée, d'une pensée, d'une pulsion qu'on ne peut chasser. Idée ou impulsion motrice incoercible qui fait irruption dans le champ de la conscience et qui a tendance à revenir.

OEPIDE (complexe) : intérêt sexuel de l'enfant pour le parent de sexe opposé et émotions agressives envers le parent du même sexe, accompagné par un ensemble d'idées et de pulsions survenant entre l'âge de 3 à 6 ans.

OPPOSITION : résistance active.

ORIENTATION : possibilité que nous avons à nous orienter dans le temps et dans l'espace. Elle est perturbée dans la confusion mentale et les maladies organiques cérébrales.

PANIQUE : anxiété soudaine et intense entraînant des troubles du comportement et de la conscience. Fréquemment rencontrée dans les attaques de panique.

PARAKINESIES : mouvements normaux parasites. Fréquentes chez les schizophrènes, et

concernent les mimiques, les gestes (balancement – mastication).

PARAMNESIES : illusion de la mémoire entraînant une confusion entre le présent et le passé.

PARANOIA : caractérise une personnalité présentant une méfiance exagérée, des idées de grandeur envahissant l'ensemble de la personnalité, une rigidité et une pensée para-logique. Définit également certains délires chroniques non schizophréniques.

PARANOÏDE : caractérise un délire riche en mécanismes et thèmes (schizophrénie paranoïde).

PASSAGE A L'ACTE : (acting out) : expression par des comportements agis de certains conflits inconscients. Désigne également toute conduite impulsive hétéro ou autoagressive survenant au cours d'une psychothérapie.

PEDOPHILIE : satisfaction sexuelle obtenue par l'adulte avec des enfants impubères âgés de moins de 13 ans.

PERSEVERATION : répétition excessive et involontaire d'une activité ou d'une phrase.

PERSONNALITE : ensemble d'éléments, de comportements et de pensées. Elle intègre les éléments émotionnels, instinctuels, intellectuels et biologiques dans une dynamique originale qui donne à chacun de nous un rapport particulier avec le monde environnant.

PERVERSION OU PARAPHILIE : forme de déviation de l'instinct sexuel par rapport à son déroulement habituel. L'excitation sexuelle nécessite la présence soit d'humiliation ou de souffrance, soit la présence de personnes non consentantes, soit d'objets inanimés (fétiches).

PEUR : réponse émotionnelle physiologique désagréable, suite à un danger.

PHALLUS : il représente la fonction symbolique attribuée au pénis. C'est un fantasme qui laisse supposer que la possession d'un pénis procure complétude et puissance – Le pénis étant l'organe mâle dans sa réalité anatomique.

PHOBIE : peur intense non justifiée envers un objet, une situation précise. Elle s'accompagne de tentatives d'évitement. Certaines phobies sont habituelles et courantes : phobie d'animaux comme le serpent par exemple.

PHOTOSENSIBILISATION : sensibilité cutanée aux radiations lumineuses (soleil). Elle peut être provoquée par la prise de neuroleptiques.

PREVENTION :

- 1- Primaire : promouvoir la santé en éliminant les facteurs responsables du développement de la maladie.
- 2- Secondaire : dépistage précoce et traitement précoce de la maladie.
- 3- Tertiaire : réduire l'incapacité résultant de la maladie et valorisant la réadaptation.

PROJECTION : attribuer à autrui nos craintes, nos désirs, nos souhaits inacceptables : peut conduire à une activité délirante (CF. psychanalyse).

PSEUDO-MUTUALITE : comportement d'une famille qui apparaît comme unie et heureuse même s'il n'y a pas de liens intimes entre ses membres.

PSYCHANALYSE :

- a- Méthode d'investigation de l'inconscient élaboré par S. Freud entre 1887 et 1939.
- b- Méthode de traitement consistant à interpréter le matériel inconscient amené grâce à la libre association aux rêves et aux désirs des patients, pour résoudre les conflits psychologiques inconscients.
- c- Théorie du développement et du comportement humain développé par Freud et ses disciples. Cette théorie psychologique considère que les conflits inconscients sont à la base des troubles psychiques. Elle constitue un ensemble de données psychologiques et psychopathologiques issues de l'investigation et du traitement psychanalytique.

PSYCHOSE : ensemble d'affections psychiatriques caractérisées par leur gravité, par une perte de contact avec la réalité et une absence de conscience des troubles.

PSYCHOTHERAPIE : thérapie par l'esprit. On compte actuellement plus de 300 formes de psychothérapie qui tentent d'utiliser des moyens psychologiques dans le cadre d'une relation afin de traiter les désordres psychiques.

PULSION : pour la théorie psychanalytique, c'est un désir d'agir d'ordre psychologique mais exprimant un besoin physiologique (sommeil, sexualité, appétit...).

QUOTIENT INTELLECTUEL : évaluation déterminée par des tests psychométriques indiquant la relation entre l'âge mental et l'âge chronologique. $Q.I. = \text{âge mental} / \text{âge chronologique} \times 100$.

RAPTUS : c'est une impulsion paroxystique irrépressible immédiate et explosive. Elle prend souvent une forme violente : suicide, agression, automutilation, fuite.

RATIONALISATION : la justification de sentiment, de conduite par des explications intellectuelles. Mécanisme de défense permettant de falsifier la réalité en construisant des explications socialement logiques et acceptables pour expliquer un comportement plutôt que de l'attribuer à un désir ou pulsion inconsciente.

REFOULEMENT : (Cf. psychanalyse) : des désirs ou des affects inacceptables sont bannis de la conscience. Ces désirs réprimés peuvent revenir sous forme déguisée. Mécanisme de défense inconscient très utilisé, à base de tous les autres mécanismes. Il s'agit d'un éloignement dans l'inconscient, des idées, désirs, pensées, pulsions, expériences inacceptables afin de diminuer l'anxiété qu'elles provoquent.

REGRESSION : retour partiel ou symbolique à des modalités de réaction et de pensée infantile.

RETICENCE : des attitudes consistant à éviter d'exprimer sa pensée, par méfiance chez le paranoïaque par exemple, ou par gêne chez le timide.

RETROACTION : (feed-back) modèle permettant d'améliorer les performances et de corriger les erreurs.

RORSCHACH : (test de) 1921 : test de personnalité, permet d'étudier l'interprétation donnée par le patient concernant une série de douze planches, représentant des tâches de forme et de couleur différentes.

SADISME : plaisir sexuel et satisfaction érotique obtenus en infligeant douleur physique et mentale.

SATYRISME : chez l'homme état de désir sexuel excessif et permanent.

SEVRAGE : syndrome en rapport avec la cessation de la prise d'une substance psycho-active dont l'utilisation était régulière (implique l'existence d'une tolérance et dénotant une dépendance).

SCHIZOPHASIE : terme proposé par KRAEPELIN pour définir le langage incompréhensible de certains schizophrènes.

SEPARATION : (anxiété de) peur et appréhension de perdre ou d'être séparé d'une personne investie (parents pour l'enfant). Chaque séparation même au cours d'une psychothérapie, ravive le processus.

SOCIOTHERAPIE : méthode de traitement orientée vers les facteurs sociaux, environnementaux et interpersonnels.

SODOMIE : coït anal entre partenaires.

SOMATOGNOSIE : image de notre propre corps : les troubles du schéma corporel peuvent signifier une lésion organique ou des troubles mentaux.

SOMNAMBULISME : déplacements pendant le sommeil dans un état de conscience particulier.

STEREOTYPIE : répétition mécanique d'un acte. Fréquent dans la schizophrénie.

STUPEUR : état au cours duquel, brutalement, les repères extérieurs sont perdus.

SUBLIMATION : peut être considérée comme un mécanisme de défense. Ce serait alors un mécanisme de défense réussi. Ce mécanisme permet à la représentation et au but pulsionnel qui est abandonnée au profit d'un nouveau but autorisé par le Surmoi, de s'exprimer. C'est un processus normal à condition qu'elle ne supprime pas toute activité agressive ou sexuelle. L'activité artistique est une sublimation ; « l'amitié » en est un autre exemple.

SURDITE VERBALE : perte de la compréhension de la parole – variété d'agnosie auditive due à une lésion temporale gauche.

SURMOI : instance de la personnalité décrite par Freud généralement inconsciente qui contient les idéaux du Moi et la conscience qui critique et défend certaines pulsions, fantasmes, émotions ou actions. Le Surmoi est l'héritier des exigences sociales et parentales.

SUICIDE : agression meurtrière dirigée vers soi. Il doit être recherché dans la maladie dépressive.

SYNDROME D'INFLUENCE : croyance en des forces qui dirigent et soumettent la pensée, l'acte ou la volonté.

TASIKINESIE : fait partie du syndrome hyperkinétique – effet secondaire aux neuroleptiques –

déambulation forcée.

TIC : mouvements musculaires involontaires brefs et soudains, rapides et répétés atteignant un muscle ou un groupe de muscles en liaison fonctionnelle (simple : haussement des épaules, écarquillement des yeux – complexe : accroupissement).

TOLERANCE : - à une substance (autrefois dénommée accoutumance) – consiste dans la nécessité d'augmenter les doses pour éprouver les effets identiques.

TACHYPSYCHIE : rythme accéléré de la pensée donnant un débit verbal important et des troubles de l'attention. Elle est fréquemment rencontrée dans la manie.

TRANSFERT : (Cf. psychanalyse) : Il définit une attitude inconsciente permettant aux émotions et aux désirs liés à l'origine à une personne importante au cours de l'enfance, d'être transférés sur une personne actuelle. L'installation et la résolution du transfert caractérisent la cure psychanalytique.

TRAVESTI : individu qui s'habille avec les vêtements de l'autre sexe.

TRICYCLIQUES : famille de médicaments d'antidépresseurs (Imipramine par exemple).

TROUBLE DU COURS DE LA PENSEE : perturbation – relâchement des associations.

UROLALIE : plaisir sexuel associé au désir d'uriner sur un partenaire ou vice-versa.

VAGINISME : contraction involontaire et d'origine psychologique du tiers inférieur du vagin lors de la pénétration, ce qui rend la relation sexuelle impossible.

VERBIGERATION : répétition de mots ou de phrases dénudées de sens.

VOYEURISME : tendance à éprouver du plaisir à observer clandestinement des personnes dans des situations intimes.

WECHSLER : Test d'intelligence. Existe en 2 versions : pour adulte (W.A.I.S) et pour enfant (W.I.S.C). Il comprend 6 épreuves verbales (vocabulaire, jugement...etc...) et 6 épreuves non verbales (puzzle, labyrinthes etc...). Ce test permet de déterminer un quotient intellectuel.